

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

ま きょう かん せき とう
漢方製剤 **ニタンダ** **麻杏甘石湯エキス顆粒**

第2類医薬品

「麻杏甘石湯」は、“せき、ぜんそく”に用いる代表的な漢方処方です。

本処方、咳きこむとき、顔面に赤味がさし、のどが乾き、痰が濃くなり、ゼーゼーという呼吸音がするという方に適応します。

「ニタンダ麻杏甘石湯エキス顆粒」は、かぜ等によるせき、ぜんそくに効果があり、特に小児のぜんそくにも効果があります。

また、本剤中に麻杏甘石湯エキスが、現在厚生労働省で認められている最大量配合されています。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<成分・分量>

1日量3包(6g)中に麻杏甘石湯乾燥エキスが2.4g含まれています。

マオウ (麻黄)……………	4g
キョウニン (杏仁)……………	4g
カンゾウ (甘草)……………	2g
セッコウ (石膏)……………	10g

より抽出。

添加物として乳糖、セルロース、ステアリン酸
マグネシウムを含有する。



<効能・効果>

せき、ぜんそく

<用法・用量>

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは…食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量
成 人(15歳以上)	1 包
7～14歳	2/3包
4～ 6歳	1/2包
2～ 3歳	1/3包
2 歳 未 満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、原料の相違により、顆粒の色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号